

คำแนะนำสำหรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 (COVID-19) ร่วมกับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาล (Flu)

กรณีที่ 1: ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ได้รับวัคซีน COVID-19 ให้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (Flu) ก่อน เมื่อครบกำหนด 1 เดือน จึงรับวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ต่อไปได้ โดยระยะห่างระหว่างเข็มของวัคซีน COVID ขึ้นอยู่กับชนิดวัคซีน

(Flu — COVID 1 — COVID 2)

กรณีที่ 2: ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 1 แล้ว จะรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (Flu) ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 1 ที่ได้รับไปแล้ว ดังนี้

- วัคซีน COVID-19 เป็นชนิด Sinovac (SV)
 - 1) กรณีได้รับ COVID-19 ชนิด Sinovac เข็มที่ 1 (SV1) ให้ท่านรับวัคซีน COVID-19 ชนิด Sinovac เข็มที่ 2 (SV2) ครบทั้ง 2 เข็มก่อน โดยฉีดห่างกัน 2-4 สัปดาห์ จึงรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (Flu) ได้ โดยห่างจากวัคซีน COVID-19 ชนิด Sinovac เข็มที่ 2 อย่างน้อย 1 เดือน
(SV1 — SV2 — Flu)
- วัคซีน COVID-19 เป็นชนิด AstraZeneca (AZ)
 - 2) กรณีได้รับวัคซีน COVID-19 ชนิด AstraZeneca เข็มที่ 1 (AZ1) ในระหว่างรอกำหนดฉีดวัคซีน COVID-19 ชนิด AstraZeneca เข็มที่ 2 (AZ2) ท่านสามารถรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (Flu) ได้ โดยห่างจากวัคซีน COVID-19 ชนิด AstraZeneca เข็มที่ 1 (AZ1) อย่างน้อย 1 เดือน และหลังจากนั้น ฉีดวัคซีน COVID-19 ชนิด AstraZeneca เข็มที่ 2 (AZ2) ตามกำหนดนัด โดยมีระยะห่างจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (Flu) อย่างน้อย 1 เดือน และมีระยะห่าง 10-12 สัปดาห์จากวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1 (AZ1)
(AZ1 — Flu — AZ2)
 - 3) กรณีที่ต้องการรับวัคซีน COVID-19 ชนิด AstraZeneca (AZ) ให้ครบถ้วนทั้ง 2 เข็ม ซึ่งฉีดห่างกัน 10-12 สัปดาห์ ท่านจะสามารถรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (Flu) ได้ หลังจากได้รับวัคซีน COVID-19 ชนิด AstraZeneca เข็มที่ 2 (AZ2) แล้วอย่างน้อย 1 เดือน
(AZ1 — AZ2 — Flu)

หมายเหตุ : วัคซีน COVID-19 ชนิด Sinovac เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 มีระยะห่าง **2-4 สัปดาห์**
วัคซีน COVID-19 ชนิด AstraZeneca เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 มีระยะห่าง **10-12 สัปดาห์**

นพ.สาธิต ทิมขำ
ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ
วันที่ 5 พค.64

No	Model	Time line	หมายเหตุ
1	Flu → COVID 1 → COVID 2 พค. มีย. กค./สค. (ตามชนิดวัคซีน COVID)	ฉีด Flu ก่อน COVID	Flu อย่างเร็ว พค.
2	SV1 → SV2 → Flu พค. มีย. กค.	ฉีด Flu หลัง Sinovac ครบ 2 เข็ม	Flu อย่างเร็ว กค.
3	AZ1 → Flu → AZ2 พค. มีย. กค.	ฉีด Flu ระหว่าง AstraZeneca เข็มที่ 1 และ เข็มที่ 2	Flu อย่างเร็ว มีย.
4	AZ1 → AZ2 → Flu พค. กค. สค.	ฉีด Flu หลัง AstraZeneca ครบ 2 เข็ม	Flu อย่างเร็ว สค.
หมายเหตุ : วัคซีน COVID-19 ชนิด Sinovac เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 มีระยะห่าง 2-4 สัปดาห์ วัคซีน COVID-19 ชนิด AstraZeneca เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 มีระยะห่าง 10-12 สัปดาห์			